
جدول تغذیه نخیلات جنوبگان

Date Palm Fertilizer Recommendations

جنوبگان JONOOBGAN

دوست کشاورز

آذر ماه ۱۴۰۳

مراحل رشد	چالکود	قبل از گرده افشانی (استارت)	زمان رشد زایشی (پس از تلقیح)	حبابوک (نخودی شدن)	کیمری (نخودی تا فندقی شدن)	ابتدای مرحله خارک	انتهای مرحله خارک و قبل از مرحله رطب	بعد از برداشت	یادداشت و توصیه کارشناس
کود									
کمپلکس نخیلات	۱ کیلو تا ۳ کیلوگرم به ازاری هر نفر نخل								
هیومیسول		۴۰ لیتر در هکتار							
اوره فسفات		۵۰ کیلو گرم در هکتار							
فروت ست		۲/۵ در هزار						۲/۵ در هزار	
آمینوگان		۰/۵ در هزار						۵۰ کیلو در هکتار	
نیترات کلسیم			۵۰ کیلو در هکتار						
فرتریکس ۲۰-۲۰-۲۰				۵۰ کیلو در هکتار					
سوپر سونینگ				۰/۵ در هزار					
سیلیکاسول					۲ در هزار				
میکروریزمغذی			۳۰ کیلو در هکتار						
سولفات منیزیم					۲۵ کیلو در هکتار				
فرتریکس ۳۰-۵-۱۵					۳۰ کیلو در هکتار				
سولفات پتاسیم						۲۰ کیلو گرم در هکتار	۴۰ کیلو در هکتار		
فرتریکس ۳۶-۱۲-۱۲						۲۰ کیلو گرم در هکتار			
۲۰:۲۰:۲۰ محلولپاشی				۱ در هزار					
میناسول کلسیم منیزیم							۱ در هزار		

مصرف خاکی

مصرف آبیاری

مصرف محلولپاشی

- توصیه های ذکر شده عمومی است و با توجه به میزان کمبود و شرایط محیطی، امکان استفاده از کودهای جایگزین و تکمیلی با نظر کارشناسان خبره امکان پذیر میباشد.
- آنالیز خاک و برگ بهترین روش جهت شناسایی کمبود ها و تنظیم برنامه کودی میباشد.
- درصورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
- استفاده از صابون های محلولپاشی جنوبگان و رکتیفایر به همراه تمام محلولپاشی ها توصیه میگردد.
- محلولپاشی در ساعات اولیه روز و در هوای خنک انجام گیرد.







دفتر مرکزی ۰۳۴ ۳۲۲۶۱۷۳۳

دفتر تهران ۰۲۱ ۸۸۸۱۳۴۲۴ ۶

صدای مشتری ۰۲۱ ۲۸۴۲۷۲۷۲

www.jonoobgan.com jonoobgan

info@jonoobgan.com @jonoobgan