
جدول تغذیه هلو و شلیل جنوبگان

Peach and nectarine Fertilizer Recommendations


جنوبگان JONOOBGAN


دوست کشاورز

آذر ماه ۱۴۰۳

مراحل رشد / کود	تغذیه خواب زمستانه	تورم جوانه ها	ابتدای تشکیل میوه	فندقی شدن	گردویی شدن	درشت شدن محصول	بعد از برداشت
							
کمپلکس پلاس	۳۰۰-۲۰۰ کیلو در هکتار						
هیومیسول			۲۰-۱۰ لیتر در هکتار		۲۰-۱۰ لیتر در هکتار		
فروت ست پلاس		۱ لیتر در هزار					۱ لیتر در هزار
میناسول کلسیم منیزیم				۱ لیتر در هزار			
میناسول کلسیم بر					۲ لیتر در هزار		
فرتریکس ۲۰-۲۰-۲۰			۲۰ کیلو گرم در هکتار				
آمینوگان			۰٫۵ لیتر در هزار			۰٫۵ لیتر در هزار	
سیویکا			۰٫۵ لیتر در هزار				
سوپر سوئینگ				۰٫۵ کیلو گرم در هکتار			
میکرو ریز مغذی				۲۵-۲۰ کیلو در هکتار			
فرتریکس ۳۰-۵-۱۵							۴۰ - ۳۰ کیلو در هکتار
پیکاسول مس					۰٫۵ لیتر در هزار		
فورتیکا						۲ لیتر در هزار	
پتاسل						۴۰ - ۳۰ کیلو در هکتار	
فرتریکس ۳۶-۱۲-۱۲					۴۰ - ۳۰ کیلو در هکتار		
نیترات کلسیم							۷۵ - ۷۰ کیلو در هکتار
۲۰۲۰۲۰ محلولپاشی				۱ لیتر در هزار			

یادداشت و توصیه کارشناس







- توصیه های ذکر شده عمومی است و با توجه به میزان کمبود و شرایط محیطی، امکان استفاده از کودهای جایگزین و تکمیلی با نظر کارشناسان خبره امکان پذیر میباشد.
- آنالیز خاک و برگ بهترین روش جهت شناسایی کمبود ها و تنظیم برنامه کودی میباشد.
- درصورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
- استفاده از صابون های محلولپاشی جنوبگان و رکتیفایر به همراه تمام محلولپاشی ها توصیه میگردد.
- محلولپاشی در ساعات اولیه روز و در هوای خنک انجام گیرد.



دفتر مرکزی: ۰۳۴-۳۲۲۶۱۷۳۳

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۸۱۳۴۲۴-۶

صدای مشتری: ۰۲۱-۲۸۴۲۷۲۷۲

www.jonoobgan.com jonoobgan

info@jonoobgan.com @jonoobgan